

Feuille de TD n°1
Calcul différentiel

Exercice 1.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^5$. Montrer que f est différentiable et calculer $d_x f$.
2. Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec $n \geq 1$, définie par $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), f(A) = A^3$. Montrer que f est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et calculer sa différentielle.
3. Soient E, F deux espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$, telle qu'il existe $M > 0$ telle que pour tout $x \in E$, on a $\|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E^2$. Montrer que f est différentiable en $x = 0$ et calculer $d_0 f$.

Exercice 2. On considère $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n . Étudier la différentiabilité des deux fonctions suivantes

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ P & \mapsto & \int_0^1 P^3(t) - P^2(t) dt \end{array} \quad \begin{array}{rcl} g : \mathbb{R}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_{2n}[X] \\ P & \mapsto & P' - P^2. \end{array}$$

Exercice 3. Soient E, F deux espaces vectoriels normés, $f : E \rightarrow F$ une application et a un point de E .

1. Montrer que lorsque f est différentiable, alors f admet des dérivées dans toutes les directions et pour tout $u \in E \setminus \{0\}$, exprimer cette dérivée $D_u f(a)$ en fonction de la différentielle.
2. Exprimer, lorsque f est différentiable, la différentielle de f en a en fonction de la dérivée dans la direction $(1, 0)$ et de la dérivée dans la direction $(0, 1)$.

Exercice 4. Soit f la fonction définie par

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \end{array}$$

1. Démontrer que f est continue en $(0, 0)$.
2. Démontrer que f admet toutes des dérivées dans toutes les directions en $(0, 0)$.
3. Montrer cependant que f n'est pas différentiable.

Exercice 5. On considère,

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & \begin{cases} \frac{x^3y}{x^4+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \end{array}$$

1. Démontrer l'inégalité suivante : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, 2|xy| \leq x^2 + y^2$.
2. En déduire que f est continue sur \mathbb{R}^2 .
3. Montrer que les dérivées directionnelles de f en $(0, 0)$ existent et les calculer.
4. Montrer cependant que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 6. Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow E$ une application différentiable. On définit

$$\begin{array}{rcl} u : \mathbb{R} & \rightarrow & E, \\ x & \mapsto & f(x, -x) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rcl} v : \mathbb{R}^2 & \rightarrow & E \\ (x, y) & \mapsto & f(y, x). \end{array}$$

1. Montrer que u et v sont différentiables et calculer leurs différentielles en fonction de la différentielle de f .
2. Calculer les dérivées partielles de u et v en fonction de celle de f .

Exercice 7.

1. Soit E un espace euclidien munit de sa norme euclidienne $\|\cdot\|_2$. Montrer que $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in E, N(x) = \|x\|_2^2$ est différentiable sur E et calculer sa différentielle. En déduire que $\forall x \in E \setminus \{0\}, \|\cdot\|_2$ est différentiable en x et calculer sa différentielle.
2. Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie et $\|\cdot\|$ une norme quelconque de E . Montrer que $\|\cdot\|$ n'est pas différentiable en 0.

Exercice 8. Soit E un espace euclidien de dimension n . Soit u un endomorphisme de E symétrique, id est, $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$.

1. Montrer que l'application

$$\begin{array}{rcl} f : E & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \langle u(x), x \rangle, \end{array}$$

est différentiable sur E et calculer sa différentielle.

2. Soient α et $\beta : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions différentiables sur E . Montrer que

$$\begin{array}{rcl} \Pi : E & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \alpha(x) \times \beta(x), \end{array}$$

est différentiable et calculer sa différentielle en fonction de celle de α et de β .

3. Déduire des questions précédentes que

$$\begin{array}{rcl} \varphi : E \setminus \{0\} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{\langle u(x), x \rangle}{\langle x, x \rangle}, \end{array}$$

est une application différentiable sur $E \setminus \{0\}$ et calculer sa différentielle.

4. Montrer que pour tout $a \in E \setminus \{0\}$, on a $D\varphi(a) = 0$ si et seulement si a est un vecteur propre de u .

Exercice 9. Soient E un espace euclidien munit de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$, $a \in E$ et

$$\begin{array}{rcl} f : E \setminus \{a\} & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & \frac{a-x}{\|x-a\|^2}. \end{array}$$

Montrer que f est différentiable sur $E \setminus \{a\}$, calculer sa différentielle et montrer que

$$Df(x).h = \frac{S.h}{\|x-a\|^2}$$

où S est la symétrie orthogonale d'axe $x - a$.