

Feuille 1. Les équations différentielles.

Exercice 1. Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' + 2y = 4x^2$ avec $y(0) = 3$.
2. $y' + y = 2e^x$ avec $y(0) = 0$.
3. $y' - 3y = 2e^{3x}$ avec $y(1) = 4e^3$.
4. $y' - y = x + e^x$ avec $y(0) = -1$.
5. $3y' - 2y = 3\cos(2x)$ avec $y(0) = \frac{17}{20}$.
6. $y' + y = 2xe^{-x}$ avec $y(0) = 1$.

Exercice 2. Soit $a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et intégrable sur \mathbb{R}_+ . Etablir que les solutions de $y'(t) - a(t)y(t) = 0$ sont bornées sur \mathbb{R}_+ .

Exercice 3. Résoudre l'équation différentielle suivante :

$$\operatorname{sh}(x)y'(x) - \operatorname{ch}(x)y(x) = 1.$$

Exercice 4. Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y'' - 8y' + 15y = 15x^2 - 16x + 17$ avec $y(0) = 3$, $y'(1) = 2(1 + e^3)$.
2. $y'' - \sqrt{2}y' + y = x + 1$ avec $y(0) = 1 + \sqrt{2}$, $y'(0) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$.
3. $y'' + y' - 6y = 4e^x$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = -22$.
4. $y'' - 4y' + 4y = -6e^{2x}$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$.
5. $y'' - 4y = x + e^{2x}$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
6. $y'' - 3y' + 2y = 10\sin(x)$ avec $y(0) = 6$, $y''(0) = 0$.
7. $y'' - 2y' + 2y = 5\cos(x)$ avec $y(0) = 2$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2\left(e^{\pi/2} + 1\right)$.
8. $y'' - 4y' + 4y = xe^{2x}$ avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$.

Exercice 5. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle suivante :

$$x(x+1)y''(x) + (x+2)y'(x) - y(x) = 0.$$

Exercice 6. Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' - 2xy = (1 - 2x)e^x$ avec $y(0) = 5$.
2. $y' - 2xy = e^{x^2}\sin(x)$ avec $y(0) = 1$.
3. $y' - \cos(x)y = \cos(x)$ avec $y(0) = 0$.
4. $y' - \cos(x)y = \sin(2x)$ avec $y(0) = -1$.
5. $\sin(x)y' - \cos(x)y = 3x^2\sin^2(x)$ avec $y'(0) = 2$.
6. $(1 - x^2)y' - 2xy = x^2$ avec $x \in]-1, 1[$.
7. $(1 + x^2)y' + xy - 2x = 0$ avec $y(1) = 3$.
8. $x(x-1)y' - (2x-1)y + x^2 = 0$ avec $x > 0$.

Exercice 7. Résoudre les systèmes d'équations différentielles suivants où x , y et z sont des fonctions de la variable t .

$$1. \begin{cases} x'(t) = 2x(t) + 4y(t) \\ y'(t) = x(t) - y(t), \end{cases} \quad \text{avec } x(0) = 5 \text{ et } y(0) = 0.$$

$$2. \begin{cases} x'(t) = x(t) - y(t) + 4z(t) \\ y'(t) = 3x(t) + 2y(t) - z(t) \\ z'(t) = 2x(t) + y(t) - z(t) \end{cases}$$

Exercice 8. Justifier l'existence d'une solution et résoudre le système d'équations différentielles suivant,

$$\begin{cases} x'(t) = 4x(t) - y(t) - z(t) + t \\ y'(t) = x(t) + 2y(t) - z(t) + 2t, \quad t \in \mathbb{R}. \\ z'(t) = x(t) - y(t) + 2z(t) - t \end{cases}$$

Exercice 9. Discuter l'ensemble des solutions de l'équation suivante et déterminer les solutions développables en série entière :

$$2xy''(x) + y'(x) - y(x) = 0.$$

Exercice 10. Soient I un intervalle de \mathbb{R} , $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues et (y_1, y_2) un système fondamental de solutions de l'équation

$$(E) \quad y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = 0.$$

Déterminer une équation différentielle d'ordre 1 vérifiée par le wronskien de (y_1, y_2) .

Exercice 11.

1. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue de limite nulle en $+\infty$. Montrer que toute solution y de l'équation différentielle $y'(t) + y(t) = h(t)$ converge vers 0 en $+\infty$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe \mathcal{C}^1 . On suppose que $f'(t) + f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} l$. Montrer que $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} l$.

Exercice 12. Résoudre l'équation différentielle $y(x) - xy'(x) = \frac{y^3}{4}$ avec pour condition $y(5) = \frac{5}{2}$.