

**Licence Mathématiques, Informatique
et Statistique 3^{ème} année**

Mathématiques 1610

Travail à rendre à M. Lauvergnat le mardi 25 avril 2017. Le travail peut être effectué en groupe mais la rédaction doit être **personnelle**. Toutes les réponses doivent être soigneusement justifiées.

Responsables : MM. Benoît Cossen & Ronan Lauvergnat

Exercice 1 : Soient f une fonction de classe \mathcal{C}^1 de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} et $r \in \mathbb{R}$. On dit que f est homogène de degré r si $\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2$, $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $f(tx; ty) = t^r f(x; y)$.

- 1) Montrer que si f est homogène de degré r , alors ses dérivées partielles sont homogènes de degré $r - 1$.
- 2) Montrer que f est homogène de degré r si et seulement si

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x; y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x; y) = r f(x; y)$$

- 3) Montrer que si f est homogène de degré r et de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R}^2 alors,

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2, x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x; y) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x; y) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x; y) = r(r-1)f(x; y)$$

Exercice 2 : On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^n dt.$$

- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \leq \frac{2}{n+1}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
- 2) Soit $(\delta_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels compris entre $]0, 1[$. Justifier que

$$\int_{1-\delta_n}^1 \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^n dt \geq \delta_n \left(\frac{1+(1-\delta_n)^2}{2} \right)^n,$$

et montrer que lorsque $\delta_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, alors

$$\left(\frac{1+(1-\delta_n)^2}{2} \right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\equiv} \exp(-n\delta_n + o(n\delta_n)).$$

- 3) En choisissant convenablement la suite $(\delta_n)_{n \geq 1}$, déduire de la question précédente que $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ diverge.
- 4) Calculer ρ le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$.
- 5) Justifier que $\sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n a_n$ converge.
- 6) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(t) = (-1)^n \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^n$. Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge simplement mais pas uniformément sur $[0, 1[$.
- 7) Soit $a \in]0, 1[$, calculer $\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_0^a f_n(t) dt$.
- 8) En déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$.